



ADUAR®

 VENTA
BAJO
RECETA

MEBENDAZOL 200 mg - TINIDAZOL 200 mg • Comprimidos recubiertos
MEBENDAZOL 40 mg/ml - TINIDAZOL 40 mg/ml • Suspensión extemporánea
COMPOSICION
Comprimidos recubiertos
Cada comprimido recubierto contiene:

 Mebendazol 200,00 mg.
 Tinidazol 200,00 mg.
 Hidroxipropilmetilcelulosa, povidona K30, cellactose 80, almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, opadry YS I-7003, rojo punzó L.A., c.s.

Suspensión extemporánea
Cada 30 ml de suspensión reconstituida contiene:

 Mebendazol 1,200 g.
 Tinidazol 1,200 g.
 Sacarina sódica, goma guar, esencia de cereza, carbonato de sodio, rojo punzó 4R, sacarosa, agua purificada, c.s.

**ACCION
TERAPEUTICA**

La asociación de los dos fármacos que componen la fórmula hacen que la misma tenga una acción antiparasitaria total.

ADUAR es un vermífida indicado en oxiuriasis, ascariasis, ancylostomiasis, necatoriasis, trichuriasis y teniasis.

Además también es efectivo en presencia de tricomonas, giardias y entamoeba histolytica.

**ACCIONES
COLATERALES
Y SECUNDARIAS**

En casos aislados pueden presentarse: anorexia, náuseas, vómitos o diarreas.

**POSOLOGIA - MODO
DE ADMINISTRACION**
Comprimidos:

Niños mayores de 6 años y adultos: ½ comprimido cada 24 horas.

Suspensión oral extemporánea:

Niños menores de 6 años: ½ medida (2,5 ml) cada 24 horas.

Niños mayores de 6 años y adultos: 1 medida (5 ml) cada 24 horas.

El tratamiento se realiza durante 3 días consecutivos.

Forma de preparar la suspensión oral extemporánea:

- 1) Agregar agua potable hasta el nivel indicado en el frasco.
- 2) Tapar y agitar vigorosamente hasta lograr una suspensión homogénea.
- 3) Se podrá ver que el nivel del líquido está por debajo del indicado.
- 4) Agregar más agua hasta el nivel indicado.
- 5) Agitar nuevamente el frasco enérgicamente.
- 6) Antes de administrar cada dosis agitar el frasco varias veces.

Nota: Una vez reconstituida la suspensión, debe conservarse en la heladera (5 °C), manteniendo de esta forma su acción terapéutica durante un período de 10 días. Pasado el lapso establecido, debe desecharse la suspensión remanente.

CONTRAINDICACIONES

No debe administrarse durante el embarazo.

PRESENTACION
ADUAR (comprimidos): envase conteniendo 6, 7, 10, 50, 100, 500 y 1000 comprimidos recubiertos; los cuatro últimos para uso hospitalario.

ADUAR (suspensión oral extemporánea): envase conteniendo 1, 10, 50, 100 y 1000 frascos con 18 g de polvo para preparar 30 ml de suspensión; los cinco últimos para uso hospitalario.

CONSERVACION

Conservar entre 15 °C y 30 °C, al abrigo de la luz.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Directora Técnica: Nancy Ruiz - Farmacéutica.

Elaborado por:


Vannier®
Laboratorio VANNIER S.A.

Laboratorio de Especialidades Medicinales

Planta Industrial y Administración:

Benito Quinquela Martín 2228 (C1296ADT)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tels.: (011) 4303-4365/4366/4114

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 42.561

Rev. 10/11

IPPR09011