

**DERMAX VX®**VENTA  
BAJO  
RECETA**SODIO PROPIONATO 3,0 g, ZINC UNDECILENATO 10,0 g, ZINC OXIDO 20,0 g, ACIDO SALICILICO 0,6 g • POLVO**

<b>COMPOSICION</b>	<i>Cada 100 g de polvo contiene:</i>
	Sodio propionato..... 3,00 g
	Zinc undecilenato..... 10,00 g
	Zinc óxido..... 20,00 g
	Acido salicílico..... 0,60 g
	Acido bórico..... 3,00 g
	Metilparabeno..... 0,07 g
	Propilparabeno..... 0,07 g
	Almidón de maíz..... 5,00 g
	Talco c.s.p..... 100,00 g

**ACCION TERAPEUTICA** Emoliente y protector cutáneo.

**CODIGO ATC** D02A.

**INDICACIONES** Debido a su acción como emoliente y protector cutáneo se indica en el tratamiento de quemaduras, dermatitis del pañal, heridas o úlceras.

**ACCION FARMACOLOGICA** El Propionato de Sodio se usa generalmente en combinación con otros agentes antimicrobianos por vía externa para el tratamiento de infecciones por dermatofitos. El Acido Undecilénico tiene acción fungistática. El Zinc presente tanto en la forma de Undecilenato como Oxido proporciona una acción astringente que contribuye a suavizar y proteger la piel en los casos de eczemas, escoriaciones leves, heridas y úlceras venosas. Además el Oxido de Zinc refracta la luz U.V. protegiendo a la zona de los efectos dañinos de la radiación. El Acido Salicílico tiene propiedades queratolíticas y cuando se aplica por vía externa y se emplea en el tratamiento de hiperqueratosis y descamación de la piel. Este efecto queratolítico puede proporcionar una acción antifúngica debido a que al eliminar el estrato córneo se suprime el crecimiento de hongos y ayuda a la penetración de otros fármacos antifúngicos; tiene además una leve acción antiséptica.

**POSOLOGIA - MODO DE ADMINISTRACION** Este producto está diseñado para uso externo. Se recomienda aplicar en:  
- Quemaduras: 1 - 2 veces por día.  
- Dermatitis del pañal: cada cambio de pañal.  
- Heridas y úlceras: 2 - 3 veces por día.

**CONTRAINDICACIONES** No presenta contraindicaciones cuando se lo administra según las indicaciones de uso.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS** **Generales:** si bien no se han reportado inconvenientes relacionados con su uso, debería estarse atento ante la aparición de reacciones alérgicas. El uso de altas concentraciones de Acido Salicílico puede provocar una acción cáustica sobre la piel. Mantener alejado de los niños debido que los mismos pueden aspirar el polvo o accidentalmente volcarlo sobre los ojos al manipularlo.

**Embarazo y lactancia:** no se han informado problemas durante estas etapas.

**Interacciones medicamentosas:** el uso simultáneo con preparaciones antiacnéicas que contengan resorcinol, azufre, tretinoína, lociones astringentes, peróxido de benzoilo, cosméticos medicinales o maquillajes puede tener un efecto desecante o irritante acumulativo y producir una irritación excesiva de la piel.

**REACCIONES ADVERSAS** Generalmente es bien tolerado aunque en raras ocasiones el paciente puede experimentar sensibilización en la zona de uso.

**INFORMACION PARA EL PACIENTE** Respete las indicaciones de uso. Consulte a su médico en caso de no experimentar mejoría a los 7 días de uso o en caso de agravamiento de los síntomas. Esta medicación SOLO se indica para uso externo.

**PRESENTACION** DERMAL VX®: envase conteniendo 1 frasco de 25 ó 50 g. Para uso hospitalario exclusivamente: envases conteniendo 10, 100, 500 y 1000 frascos de 50 g.

**CONSERVACION** Conservar en su envase original a temperatura ambiente.  
**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Directora Técnica: María Florencia Pérez - Farmacéutica.

Elaborado por:

**Vannier®**

Laboratorio VANNIER S.A.  
Laboratorio de Especialidades Medicinales

Planta Industrial y Administración:  
Benito Quinquela Martín 2228 (C1296ADT)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tels.: (011) 4303-4365/4366/4114 5031-1001

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 48.498  
Rev. 07/04  
IPPR10811