



TRIMAZOL®

VENTA
LIBRE

Clotrimazol 10 mg/g • Crema dermatológica

COMPOSICION

Cada 100 g de crema dermatológica contiene:

Clotrimazol..... 1,0 g
 Esperma de ballena, alcohol cetosteárico, alcohol bencílico,
 2-octildodecanol, polisorbato de sorbitan 60, agua purificada,
 c.s.p. 100,0 g

ACCION TERAPEUTICA

Antifúngico de amplio espectro.

INDICACIONES

TRIMAZOL® crema dermatológica, para el tratamiento del pie de atleta (tinea pedis), tinea inguinal (tinea cruris), culebrilla (tinea corporis), agrietamiento, quemadura, descamación, exfoliación y malestar que pueden acompañar a estos estados.

COMO USAR ESTE MEDICAMENTO

Limpiar la piel con agua y jabón, secar a fondo. Aplicar una capa sobre la zona afectada por la mañana y por la noche o cuando lo indique el médico. Para el pie de atleta, prestar atención a los espacios entre los dedos. También ayuda usar zapatos bien ventilados y cambiarse los zapatos y medias una vez al día. Los mejores resultados en el pie de atleta y en la culebrilla son usualmente obtenidos en cuatro semanas de tratamiento y para la tinea inguinal en dos semanas. **SI EN ESTE LAPSO DE TIEMPO NO HAY CURA CONSULTE A SU MEDICO.**

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso externo solamente evitar el contacto con los ojos, no usar en niños menores de dos años, excepto bajo supervisión médica. En caso de irritación o sensibilización de la zona, debe suspenderse la aplicación del producto.

Interacciones medicamentosas: no se han reportado.

Embarazo y lactancia: no se han reportado inconvenientes en el uso de esta medicación durante estas etapas. Se desconoce si es excretada en leche materna. En caso de amamantar no colocar sobre la zona de las mamas.

Niños: los niños menores de 12 años deben supervisarse durante el uso de este producto.

CONTRAINDICACIONES

Su uso está contraindicado en caso de hipersensibilidad a la droga o a algún componente de la formulación.

REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas han sido informadas infrecuentemente con el uso tópico de Clotrimazol: enrojecimiento, picazón, ampollas, descamación, hinchazón, prurito, urticaria, ardor e irritación general de la piel.

SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 y 4658-7777

PRESENTACION

TRIMAZOL® crema: envase conteniendo 1, 10, 100 y 1000 pomos de 20 y 30 g.

CONSERVACION

Conservar en su envase original a temperatura ambiente, entre 2 y 30 °C, al abrigo de la luz.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consulte a su médico.

Directora Técnica: Nancy Ruiz - Farmacéutica.

Elaborado por:



Vannier®

Laboratorio VANNIER S.A.

Laboratorio de Especialidades Medicinales

Planta Industrial y Administración:

Benito Quinquela Martín 2228 (C1296ADT)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tels.: (011) 4303-4365/4366/4114

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 47.781

Rev. 05/14

IPPR10211



visualpoint.com.ar