

TRIMAZOL®

VENTA
LIBRECLOTRIMAZOL 10 mg/g • Crema dermatológica
CLOTRIMAZOL 10 mg/g • Polvo

COMPOSICION

Cada 100 g de crema dermatológica contiene:

Clotrimazol.....	1,00 g
Esperma de ballena, alcohol cetosteárico, alcohol bencílico, 2-octildodecanol, polisorbato, agua deionizada c.s.	100,00 g

Cada 100 g de polvo contiene:

Clotrimazol.....	1,00 g
Almidón de maíz c.s.	100,00 g

ACCION
TERAPEUTICA

Antifúngico de amplio espectro.

INDICACIONES

TRIMAZOL® crema dermatológica y polvo, para el tratamiento del pie de atleta (tinea pedis), tinea inguinal (tinea cruris), culebrilla (tinea corporis), agrietamiento, quemadura, descamación, exfoliación y malestar que pueden acompañar a estos estados.

COMO USAR ESTE
MEDICAMENTO

Crema: limpiar la piel con agua y jabón, secar a fondo. Aplicar una capa sobre la zona afectada por la mañana y por la noche o cuando lo indique el médico. Para el pie de atleta, prestar atención a los espacios entre los dedos. También ayuda usar zapatos bien ventilados y cambiarse los zapatos y medias una vez al día. Los mejores resultados en el pie de atleta y en la culebrilla son usualmente obtenidos en cuatro semanas de tratamiento y para la tinea inguinal en dos semanas.

Polvo: limpiar la piel con agua y jabón, secar a fondo. Aplicar sobre la zona afectada por la mañana y por la noche o cuando lo indique el médico. Como profilaxis se recomienda pulverizar medias y zapatos. Este producto no es efectivo en cuero cabelludo. SI EN ESTE LAPSO DE TIEMPO NO HAY CURA CONSULTE A SU MEDICO.

ADVERTENCIAS Y
PRECAUCIONES

Para uso externo solamente evitar el contacto con los ojos, no usar en niños menores de dos años, excepto bajo supervisión médica. En caso de irritación o sensibilización de la zona, debe suspenderse la aplicación del producto.

Interacciones medicamentosas: no se han reportado.

Embarazo y lactancia: no se han reportado inconvenientes en el uso de esta medicación durante estas etapas. Se desconoce si es excretada en leche materna. En caso de amamantar no colocar sobre la zona de las mamas.

Niños: los niños menores de 12 años deben supervisarse durante el uso de este producto.

CONTRAINDICACIONES

Su uso está contraindicado en caso de hipersensibilidad a la droga o a algún componente de la formulación.

REACCIONES
ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas han sido informadas frecuentemente con el uso tópico de Clotrimazol: enrojecimiento, picazón, ampollas, descamación, hinchazón, prurito, urticaria, ardor e irritación general de la piel.

SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 y 4658-7777

PRESENTACION

TRIMAZOL® Crema: envase conteniendo 1, 10, 100 y 1000 pomos de 20 g.
TRIMAZOL® Polvo: envase conteniendo 1, 10, 100 y 1000 envases de 30 g.

CONSERVACION

Conservar en su envase original a temperatura ambiente, entre 2 °C y 30 °C, al abrigo de la luz.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Ante cualquier duda consulte a su médico.

Directora Técnica: María Florencia Pérez - Farmacéutica

Elaborado en: Int. Amaro Avalos 4208, Munro, Buenos Aires, Argentina.

Vannier®

Laboratorio VANNIER S.A.
Laboratorio de Especialidades Medicinales

Planta Industrial y Administración:
Benito Quinquela Martín 2228 (C1296ADT)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tels.: (011) 4303-4365/4366/4114 5031-1001

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 47.781
Rev. 10/00
IPPR10211